



Jaro se pomalinku blíží a všichni už se netrpělivě těšíme na to, jak s našimi čtyřnohými kamarády zase vyrazíme do přírody na procházku. Při běhání a dovádění v trávě na ně ale číhají klíšťata, která jsou po zimním období vyhládlá a netrpělivě vyhlížíjí svoji oběť, na kterou by se mohla přisát. Jejich aktivita začíná již dva týdny po posledním sněhu, přičemž samičky vylézají už v březnu. Proto neváhejte a ošetřete včas svého pejska, kočičku vhodným prostředkem proti těmto nepříjemným a nebezpečným návštěvníkům. Nejhojněji se dospělá klíšťata vyskytují v květnu a v září. V následujícím článku se dozvíte co dělat, když už se klíště přisaje, jak je nebezpečné a jak před ním pejsky a kočky chránit.

Nejjednodušší způsob ochrany je po **každé procházce pejska zkontrolovat**. Pokud se nám podaří nalézt ještě lezoucí klíšťata, **nesaháme** na ně rukou, ale použijeme např. gumové rukavice. Klíště nerozmačkáváme ani nevhazujeme živé do koše. Spláchneme ho nebo spálíme.

Co dělat, když už je klíště přisáté?

- Klíště před vyndáváním raději nenatírejte olejem ani krémem. Může dojít k jeho usmrcení a k přenosu infekce pak dojde mnohem snadněji. Klíště při úhynu vypouští do rány hostitele infikované sliny.
- Pořídte si do psí lékárničky speciální pinzetku nebo tzv. krokodýlek. Jejich pomocí klíště opatrně uchopíte. Dávejte pozor, aby jste ho příliš nezmáčkli (riziko přenosu nemoci z infikovaných slin klíštěte) a opět použijte gumové rukavice. Při kontaktu s infikovaným klíštětem hrozí přenos infekce i na vás.
- Točivým nebo kývavým pohybem klíště vytáhněte a raději zkontrolujte, jestli jste ho vytáhli celé.
- Místo po klíštěti dobře dezinfikujte.
- Likvidaci klíštěte proveďte stejným způsobem jak je popsáno výše.

Co dělat když zadržíme hlavičku?

Rozhodně není důvod k panice. Samotná hlavička zvíře neinfikuje, pokud již nedošlo k infekci během přisátí nebo vytahování. Obvykle dojde ke slabé kožní reakci, vytvoří se stroupek, který odpadne i s hlavičkou. Postižené místo stačí sledovat a pravidelně dezinfikovat např. Betadinkou nebo potírat Tea Tree oilem apod. Pokud by jste si nebyly jistí, nebo pokud by místo začalo být bolestivé a zarudlé raději navštivte veterinárního lékaře.

Jaké nemoci klíště přenáší?

Klíšťata jsou přenašeči závažných infekčních onemocnění např. lymfské boreliózy, klíšťové encefalitidy, ehrlichiozy, babeziózy. Mohou způsobit alergické reakce a kožní potíže jako typické brmbolce, které se objevují po odstranění nebo odpadnutí klíštěte.

Jak se před nimi preventivně chránit?

Antiparazitární přípravky

Nejlepší prevencí proti těmto onemocněním je zabránit jejich přisátí. Na trhu máme široký sortiment antiparazitárních výrobků pro psy i kočky. Je nutné dodržovat doporučení výrobce a používat přípravky na druh zvířete, pro které je určeno. Pozor musíme dávat hlavně u přípravků pro psy, které jsou častou příčinou otrav u koček. Důležité je dodržovat i doporučený věk, od kterého se daný prostředek může používat.

Spreje – výhodou je jejich snadná aplikace. Jejich účinek je krátkodobý (1-2 měsíce dle výrobce). Je vhodný spíše pro hladkosrstá plemena a jedince, kterým nevadí syčivý zvuk. Při jejich aplikaci je důležité rozhrnout srst a aplikovat účinnou látku co nejvíce na kůži. Opatrně musíme postupovat v oblastí očí. V těchto místech je lepší použít gumovou rukavici a přípravek spíše vetřít. Jejich účinek může být repelentní (pouze odpuzují klíšťata) nebo akaricidní (hubící klíšťata). Nejšetnější varianta u štěňat a u koťat.

Obojek – snadná aplikace, ale zvíře ho musí nosit neustále. Nestačí jej připnout pouze, když půjdeme na procházku. Jeho účinek je dlouhodobý dle výrobce 4-8 měsíců a často je v kombinaci na blechy. Pokud máte malé děti, pečlivě prostudujte příbalový leták. U některých je uvedeno, že uvolňovaná látka by s nimi neměla přijít do kontaktu. Jsou dostupné v různých velikostech a barevných odstínech.

Spot – ony - pipetky nebo tubičky, které se snadno aplikují (srst se rozhrne a na několika místech podél páteře se na kůži vytlačí část pipetky. Minimálně 2 hodiny na těchto místech zvíře nehladíme. Působí poměrně krátce 1-1,5 měsíce, po té je nutné aplikaci opakovat. Na trhu je dnes velký výběr, bývají v kombinaci s účinností na blechy. Při výběru pipetky pro kočku se vždy vyvarujte použití přípravku s účinnou látkou permethrin (některé přípravky pro psy). Mohou vyvolat závažné otravy, které mohou končit smrtí.

Vakcinace proti lymbské borelióze

Je vhodná zvláště u psů s každodenním pobytem v lese (loveckých psů) a v oblastech s vyšším výskytem tohoto onemocnění. Existuje mylná domněnka, že je tato vakcína určena proti klíšťatům. Vakcína neochrání vašeho psa před přisátím klíštěte, ale zabrání vzniku onemocnění.

Jak vybrat ten správný přípravek pro mého pejska, kočičku?

Kupujte co nejkvalitnější výrobky a dodržujte pokyny výrobce, čtěte pečlivě příbalový letáček.

Při výběru vhodného přípravku proti klíšťatům i blechám právě pro Vašeho mazlíčka Vám rádi pomůžeme v naší veterinární ordinaci